

# Corrigé de la feuille d'exercices n°13

Exercices obligatoires : 1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 9 ; 11 ; 12 ; 15 ; 20 ; 23 ; 26.

## 1. Révision de Sup' sur les séries numériques

### Exercice 1.

Étudier la convergence des séries  $\sum u_n$  suivantes :

1.  $u_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{\sqrt{n}}$
2.  $u_n = a^n n!$ ,  $a \in \mathbb{R}$
3.  $u_n = n e^{-\sqrt{n}}$
4.  $u_n = \frac{\ln(n^2 + 3)\sqrt{2^n + 1}}{4^n}$ .
5.  $u_n = \frac{\ln n}{\ln(e^n - 1)}$
6.  $\left(\frac{1}{n}\right)^{1+\frac{1}{n}}$ .

#### Correction.

1. On a :

$$n^2 u_n = \exp(2 \ln n - \sqrt{n} \ln 2) = \exp\left(-\sqrt{n} \left(\ln 2 - 2 \frac{\ln n}{\sqrt{n}}\right)\right).$$

Il résulte de  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{\sqrt{n}} = 0$  que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 u_n = 0,$$

et par comparaison à une série de Riemann, la série est convergente.

2. Par croissance comparée des suites géométriques et de la suite factorielle, le terme général ne tend pas vers 0, sauf si  $a = 0$ . La série  $\sum_n u_n$  est donc convergente si et seulement si  $a = 0$ .

3. On écrit tout sous forme exponentielle :

$$n e^{-\sqrt{n}} = \exp(\ln n - \sqrt{n}).$$

On a alors

$$\frac{\exp(\ln n - \sqrt{n})}{\exp(-2 \ln n)} = \exp(3 \ln n - \sqrt{n}) \rightarrow 0$$

et donc

$$n e^{-\sqrt{n}} = o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

La série est convergente.

4. On vérifie aisément que

$$u_n \sim_{+\infty} \frac{2 \ln n}{(4/\sqrt{2})^n}.$$

Puisque  $4/\sqrt{2} > 2$ , on obtient

$$u_n =_{+\infty} o\left(\frac{1}{2^n}\right)$$

et donc la série est convergente.

5. On remarque que  $0 < \ln(e^n - 1) \leq \ln(e^n) = n$ . Ainsi, pour  $n \geq 3$ ,

$$u_n \geq \frac{\ln n}{n} \geq \frac{1}{n},$$

et donc la série de terme général  $u_n$  diverge.

6. On a

$$nu_n = \left(\frac{1}{n}\right)^{1/n} = \exp\left(-\frac{\ln n}{n}\right) \rightarrow \exp(0) = 1.$$

Ainsi,  $u_n \sim_{+\infty} \frac{1}{n}$  et la série est divergente.

## Exercice 2.

Donner la nature des séries numériques  $\sum u_n$  suivantes :

$$\begin{aligned} 1. \quad u_n &= 1 - \cos \frac{\pi}{n} & 2. \quad u_n &= \sqrt{\operatorname{ch} \frac{1}{n} - 1} \\ 3. \quad u_n &= \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2} \end{aligned}.$$

### Correction.

1. En utilisant le développement limité du cosinus, ou l'équivalent  $1 - \cos x \sim_0 \frac{x^2}{2}$ , on voit que :

$$u_n \sim_{+\infty} \frac{\pi^2}{2n^2},$$

et la série est convergente.

2. Le terme général  $u_n$  est positif, et de  $\operatorname{ch}(1/n) = 1 + 1/2n^2 + o(1/n^2)$ , on déduit que  $u_n \sim \frac{1}{\sqrt{2n}}$ . Par conséquent, la série est divergente.

3. On a :

$$\begin{aligned} u_n &= \exp\left(-n^2 \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)\right) \\ &= \exp\left(-n^2 \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)\right) \\ &= \exp\left(-n + \frac{1}{2} + o(1)\right) \\ &\sim_{+\infty} e^{1/2} e^{-n}. \end{aligned}$$

Par comparaison à une série géométrique positive et convergente, la série de terme général  $u_n$  converge.

### Exercice 3.

Montrer que la série de terme général

$$u_n = \frac{1}{\sqrt{n-1}} - \frac{2}{\sqrt{n}} + \frac{1}{\sqrt{n+1}}$$

(pour  $n \geq 2$ ) est convergente, et calculer sa somme.

#### Correction.

On a affaire à une série télescopique un peu compliquée. Les simplifications se font sur l'écriture de 3 termes consécutifs. Précisément, on a

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=2}^n \left( \frac{1}{\sqrt{k-1}} - \frac{2}{\sqrt{k}} + \frac{1}{\sqrt{k+1}} \right) \\ &= \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{\sqrt{k}} - 2 \sum_{k=2}^n \frac{1}{\sqrt{k}} + \sum_{k=3}^{n+1} \frac{1}{\sqrt{k}} \\ &= 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{1}{\sqrt{n+1}}. \end{aligned}$$

On prouve donc que la série converge, et que sa somme fait :  $1 - \frac{1}{\sqrt{2}}$ .

### Exercice 4.

Sachant que  $e = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!}$ , déterminer la valeur des sommes suivantes :

$$1. \sum_{n \geq 0} \frac{n+1}{n!} \quad 2. \sum_{n \geq 0} \frac{n^2 - 2}{n!} \quad 3. \sum_{n \geq 0} \frac{n^3}{n!}.$$

#### Correction.

1. La première somme ne pose pas de problèmes :

$$\sum_{n \geq 0} \frac{n+1}{n!} = \sum_{n \geq 0} \frac{n}{n!} + \sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!} = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{(n-1)!} + e = 2e.$$

2. La deuxième somme est plus compliquée à cause du terme en  $n^2$ . Pour qu'il se simplifie bien avec le  $n!$ , le plus commode est de l'écrire

$$n^2 = n(n-1) + n$$

de sorte que

$$\sum_{n \geq 0} \frac{n^2 - 2}{n!} = \sum_{n \geq 2} \frac{n(n-1)}{n!} + \sum_{n \geq 1} \frac{1}{(n-1)!} - 2 \sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!} = e + e - 2e = 0.$$

3. La méthode est similaire. Dit de façon algébrique, on va décomposer le polynôme  $X^3$  dans la base  $1, X, X(X-1), X(X-1)(X-2)$ . En raisonnant d'abord avec le terme de plus haut

degré, puis celui juste après, etc..., on trouve :

$$X^3 = X(X-1)(X-2) + 3X(X-1) + X.$$

On en déduit :

$$\begin{aligned} \sum_{n \geq 1} \frac{n^3}{n!} &= \sum_{n \geq 1} \frac{n(n-1)(n-2)}{n!} + 3 \sum_{n \geq 1} n(n-1)n! + \sum_{n \geq 1} \frac{n}{n!} \\ &= \sum_{n \geq 3} \frac{1}{(n-3)!} + \sum_{n \geq 2} \frac{3}{(n-2)!} + \sum_{n \geq 1} \frac{1}{(n-1)!} \\ &= 5e. \end{aligned}$$

### Exercice 5.

Soit  $\sum_n u_n$  une série à termes positifs.

1. On suppose que  $\sum_n u_n$  converge. Prouver que, pour tout  $\alpha > 1$ ,  $\sum_n u_n^\alpha$  converge.
2. On suppose que  $\sum_n u_n$  diverge. Prouver que, pour tout  $\alpha \in ]0, 1[$ ,  $\sum_n u_n^\alpha$  diverge.

#### Correction.

1. Puisque la série  $\sum_n u_n$  converge, la suite  $(u_n)$  converge vers zéro. Il existe donc un entier  $N \geq 0$  tel que, pour  $n \geq N$ , on a  $0 \leq u_n \leq 1$ . Puisque  $\alpha > 1$ , on a alors, pour  $n \geq N$ ,  $0 \leq u_n^\alpha \leq u_n$ . Puisque l'on travaille avec des séries à termes positifs, ceci entraîne la convergence de  $\sum_{n \geq 1} u_n^\alpha$ .
2. Deux cas sont possibles :
  - ou bien  $(u_n)$  ne converge pas vers 0. Dans ce cas, la suite  $(u_n^\alpha)$  ne converge pas non plus vers 0, et donc la série  $\sum_n u_n^\alpha$  diverge ;
  - ou bien  $(u_n)$  converge vers 0. Dans ce cas, il existe un entier  $N$  tel que, pour tout  $n \geq N$ , on a  $0 \leq u_n \leq 1$ . Puisque  $\alpha \in ]0, 1[$ , on en déduit que  $0 \leq u_n \leq u_n^\alpha$ . Ainsi, la série  $\sum_n u_n^\alpha$  est aussi divergente.

### Exercice 6.

Soit  $(u_n)$  une suite de réels positifs. On pose  $v_n = \frac{u_n}{1+u_n}$ .

1. Prouver que la fonction  $x \mapsto \frac{x}{1+x}$  est croissante sur  $[0, +\infty[$ .
2. Démontrer que les séries  $\sum_n u_n$  et  $\sum_n v_n$  sont de même nature.

#### Correction.

1. Il suffit d'étudier la fonction. Sa dérivée est  $x \mapsto 1/(1+x)^2 \geq 0$ , donc la fonction est croissante.
2. On distingue deux cas : si  $(u_n)$  tend vers 0, alors  $u_n \sim_{+\infty} v_n$ , et ces deux suites sont positives. Par le critère d'équivalence, on en déduit que les séries  $\sum_n u_n$  et  $\sum_n v_n$  ont la

même nature. Si  $(u_n)$  ne tend pas vers 0 (ce qui implique que  $\sum_n u_n$  diverge), alors, il existe  $\varepsilon > 0$  tel que, pour tout  $N \in \mathbb{N}$ , il existe  $n \geq N$  tel que  $u_n \geq \varepsilon$  (rappelons que  $u_n \geq 0$ ). Mais alors, d'après la première question, on a  $v_n \geq \varepsilon/(1 + \varepsilon) > 0$ , et donc la suite  $(v_n)$  ne converge pas vers 0. Ainsi, la série  $\sum_n v_n$  est aussi divergente, et dans ce cas, les séries  $\sum_n u_n$  et  $\sum_n v_n$  ont bien la même nature.

### Exercice 7.

Soit  $(u_n)$  une suite de nombres réels. Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.

1. Si  $u_n > 0$  et si la série  $\sum u_n$  converge, alors  $u_{n+1}/u_n$  a une limite strictement inférieure à 1.
2. Si  $u_n > 0$  et si la série  $\sum u_n$  converge, alors  $(u_n)$  est décroissante à partir d'un certain rang.
3. Si  $u_n > 0$ , et si la série  $\sum u_n$  converge, alors la série de terme général  $u_n^2$  converge.
4. Si  $(-1)^n n u_n \rightarrow 1$ , la série  $\sum u_n$  converge.
5. Si  $(-1)^n n^2 u_n \rightarrow 1$ , la série  $\sum u_n$  converge.

#### Correction.

1. Faux ! Prendre  $u_n = 1/n^2$ .
2. Faux ! Prendre  $u_{2n} = 1/n^2$  et  $u_{2n+1} = 2/n^2$ . On a toujours  $u_{2n+1} > u_{2n}$ , et pourtant la série converge.
3. Vrai ! Pour  $n > n_0$ , on a  $0 \leq u_n \leq 1$  et donc  $0 \leq u_n^2 \leq u_n \leq 1$ . On a convergence par majoration (le terme général est positif).
4. Faux ! Prendre  $u_n = \frac{(-1)^n}{n} + \frac{1}{n \ln n}$ .
5. Vrai ! On a convergence absolue, car à partir d'un certain rang,  $|u_n| \leq 2/n^2$ .

### Exercice 8.

Soit  $(u_n)$  une suite positive et décroissante. Prouver que si la série  $\sum_n u_n$  est convergente, alors  $(nu_n)$  tend vers 0.

#### Correction.

Procérons par l'absurde. On suppose donc que  $(nu_n)$  ne tend pas vers 0. Ainsi, il existe  $\varepsilon > 0$  tel que, pour tout entier  $N \in \mathbb{N}$ , on peut trouver  $q \geq 2N$  avec  $qu_q \geq \varepsilon$ . Autrement dit, on a  $u_q \geq \varepsilon/q$ . Puisque  $(u_n)$  est décroissante, on a encore  $u_k \geq \varepsilon/q$  pour tout  $k \leq q$ . Posons  $p = \lfloor q/2 \rfloor$ , de sorte que  $p \geq N$  et  $2p - p \geq \frac{q}{2} - 1$ . Alors

$$\sum_{k=p}^{2p} u_k \geq \sum_{k=p}^{2p} \frac{\varepsilon}{q} \geq \frac{q}{2} \times \frac{\varepsilon}{q} \geq \frac{\varepsilon}{2}.$$

En notant  $p_N$  l'entier  $p$  construit pour le choix de  $N$ , la suite  $(p_N)$  tend vers  $+\infty$ , et on a pour

tout entier  $N$ ,

$$\sum_{k=p_N}^{2p_N} u_k \geq \frac{\varepsilon}{2}.$$

D'autre part, si la série convergeait, ce serait le cas de la suite des sommes partielles  $S_p = \sum_{k=1}^p u_k$  et on devrait avoir

$$\sum_{k=p_N}^{2p_N} u_k = S_{2p_N} - S_{p_N-1} \rightarrow 0.$$

On obtient deux résultats contradictoires. L'hypothèse de départ est fausse, et donc  $(nu_n)$  tend vers 0.

## 2. Séries : techniques de Spé

### a. Exercices basiques

#### Exercice 9.

Étudier les séries de terme général suivant :

$$1. u_n = \frac{n!}{n^{an}}, \quad a \in \mathbb{R} \quad 2. u_n = \frac{n^\alpha (\ln n)^n}{n!} \text{ avec } \alpha \in \mathbb{R} \quad 3. u_n = \frac{(n!)^\alpha}{(2n)!}, \quad \alpha \in \mathbb{R}.$$

#### Correction.

1. Une série dont le terme général est constitué de puissances et de factorielles est très bien adaptée à l'utilisation du critère de D'Alembert. Dans le cas particulier de cette question, on a

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(n+1)!}{(n+1)^{a(n+1)}} \times \frac{n^{an}}{n!} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^{an} \times \frac{1}{(n+1)^{a-1}}.$$

Or, on peut écrire

$$\left(\frac{n}{n+1}\right)^{an} = \exp(-an \ln(1 + 1/n)) = \exp(-a + o(1))$$

et donc ce terme converge vers  $e^{-a}$ . On distingue alors trois cas :

- Si  $a > 1$ ,  $u_{n+1}/u_n$  tend vers 0, la série  $\sum_n u_n$  converge.
- Si  $a = 1$ ,  $u_{n+1}/u_n$  tend vers  $e^{-1} \in [0, 1[$ , et donc la série  $\sum_n u_n$  converge.
- Si  $a < 1$ ,  $u_{n+1}/u_n$  tend vers  $+\infty$ , et donc la série  $\sum_n u_n$  diverge.

2. On va utiliser la règle de d'Alembert. Pour cela, on écrit :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(n+1)^\alpha}{n^\alpha} \times \exp(n(\ln(\ln(n+1)) - \ln \ln n)) \times \frac{\ln(n+1)}{n+1}$$

Or, la fonction  $x \mapsto \ln(\ln x)$  est dérivable sur son domaine de définition, de dérivée  $x \mapsto \frac{1}{x \ln x}$ . On en déduit, par l'inégalité des accroissements finis, que

$$|\ln(\ln(n+1)) - \ln \ln(n)| \leq \frac{1}{n \ln n}.$$

Il en découle :

$$0 \leq \frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{(n+1)^\alpha}{n^\alpha} \times \exp\left(\frac{n}{n \ln n}\right) \times \frac{\ln(n+1)}{n+1}$$

On en déduit facilement, par les théorèmes de composition des limites et par le fait que  $\ln(n+1)/(n+1)$  tend vers 0, que la limite de  $u_{n+1}/u_n$  est nulle. Par la règle de d'Alembert, la série de terme général  $u_n$  est convergente.

3. On va encore utiliser la règle de d'Alembert. En effet, on a

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{((n+1)!)^\alpha}{(2n+1)!} \times \frac{(2n)!}{(n!)^\alpha} = \frac{(n+1)^\alpha}{(2n+2)(2n+1)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a$$

avec

- $a = 0$  si  $\alpha < 2$  : dans ce cas, on a convergence de la série
- $a = \infty$  si  $\alpha > 2$  : dans ce cas, on a divergence de la série
- $a = \frac{1}{4}$  si  $\alpha = 2$  : dans ce cas, on a convergence de la série.

### Exercice 10.

Soit, pour  $n \geq 1$  et  $a > 0$ , la suite  $u_n = \frac{a^n n!}{n^n}$ .

1. Étudier la convergence de la série  $\sum_n u_n$  lorsque  $a \neq e$ .
2. Lorsque  $a = e$ , prouver que, pour  $n$  assez grand,  $u_{n+1}/u_n \geq 1$ . Que dire de la nature de la série  $\sum_n u_n$  ?

#### Correction.

1. Cette série est bien adaptée à l'utilisation de la règle de d'Alembert. On calcule donc

$$\begin{aligned} \frac{u_{n+1}}{u_n} &= \frac{a^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \times \frac{n^n}{a^n n!} \\ &= a \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n} \\ &= a \exp\left(-n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)\right) \\ &= a \exp\left(-n \times \left(\frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)\right). \end{aligned}$$

On obtient donc que  $u_{n+1}/u_n$  converge vers  $a/e$ . Par application de la règle de d'Alembert, si  $a > e$ , la série est divergente. Si  $a < e$ , la série est convergente. Le cas  $a = e$  est un cas limite où le théorème de d'Alembert ne permet pas de conclure directement.

2. On pousse un peu plus loin le développement précédent. On obtient

$$\begin{aligned}\frac{u_{n+1}}{u_n} &= e \exp \left( -n \left( \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) \right) \\ &= e \exp \left( -1 + \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) \\ &= 1 + \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right).\end{aligned}$$

En particulier, pour  $n$  assez grand,  $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$ , et donc la suite  $(u_n)$  est croissante. Elle ne converge donc pas vers zéro, et la série  $\sum_n u_n$  est divergente.

### Exercice 11.

Soit  $A = \begin{pmatrix} 4/3 & -5/6 \\ 5/3 & -7/6 \end{pmatrix}$ . Démontrer que la série  $\sum A^n$  converge, et donner la valeur de  $\sum_{n \geq 0} A^n$ .

#### Correction.

On va commencer par diagonaliser  $A$ . Le polynôme caractéristique de  $A$  est  $X^2 - \frac{1}{6}X - \frac{1}{6}$  dont les racines sont  $\frac{1}{2}$  et  $-\frac{1}{3}$ . De plus, la recherche des vecteurs propres donne  $A = PDP^{-1}$  avec

$$D = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} \text{ et } P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

En particulier, on a aussi

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Fixons maintenant  $N \in \mathbb{N}$ , et utilisons que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on a  $A^n = PD^nP^{-1}$ . On obtient

$$\sum_{n=0}^N A^n = \sum_{n=0}^N PD^nP^{-1} = P \left( \sum_{n=0}^N D^n \right) P^{-1}.$$

Maintenant,

$$D^n = \begin{pmatrix} \frac{1}{2^n} & 0 \\ 0 & \frac{(-1)^n}{3^n} \end{pmatrix},$$

de sorte que

$$\sum_{n=0}^N D^n = \begin{pmatrix} \frac{1-\frac{1}{2^N}}{1-\frac{1}{2}} & 0 \\ 0 & \frac{1-\frac{(-1)^{N+1}}{3^{N+1}}}{1+\frac{1}{3}} \end{pmatrix}.$$

On en déduit que la série  $\sum_n D^n$  converge et que

$$\sum_{n=0}^{+\infty} D^n = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & \frac{3}{4} \end{pmatrix}.$$

Par continuité du produit matriciel, la série  $\sum_n A^n$  converge et

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{+\infty} A^n &= P \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & \frac{3}{4} \end{pmatrix} P^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{13}{4} & -\frac{5}{4} \\ \frac{5}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}\end{aligned}$$

### Exercice 12.

Déterminer un équivalent simple de  $\ln(n!)$ .

[Correction.](#)

On se ramène à une somme en remarquant que

$$\ln(n!) = \sum_{k=1}^n \ln(k)$$

Puisque la fonction  $\ln$  est croissante, on a pour tout  $k \geq 2$ ,

$$\int_{k-1}^k \ln(t) dt \leq \ln(k) \leq \int_k^{k+1} \ln(t) dt.$$

On somme cette inégalité pour  $k$  allant de 2 à  $n$  et, remarquant que  $\ln(1) = 0$ , on trouve

$$\int_1^n \ln(t) dt \leq \ln(n!) \leq \int_2^{n+1} \ln(t) dt.$$

Une primitive de  $\ln(x)$  étant donnée par  $x \ln x - x$ , on trouve que

$$n \ln n - n + 1 \leq \ln(n!) \leq (n+1) \ln(n+1) - (n+1) - 2 \ln 2 + 2.$$

On divise par  $n \ln n$  pour prouver que  $\ln(n!) \sim_{+\infty} n \ln n$ . La seule chose non évidente à vérifier est que

$$\frac{(n+1) \ln(n+1)}{n \ln n} \rightarrow 1.$$

Pour cela, on écrit

$$\frac{(n+1) \ln(n+1)}{n \ln n} = \frac{n \ln(n+1) + \ln(n+1)}{n \ln n} = \frac{\ln(n) + \ln(1 + \frac{1}{n})}{\ln n} + \frac{\ln n + \ln(1 + \frac{1}{n})}{n \ln n}.$$

### Exercice 13.

Étudier la nature des séries  $\sum u_n$  suivantes :

$$\begin{aligned} \mathbf{1.} \quad u_n &= \frac{\sin n^2}{n^2} & \mathbf{2.} \quad u_n &= \frac{(-1)^n \ln n}{n} \\ \mathbf{3.} \quad u_n &= \frac{\cos(n^2\pi)}{n \ln n} \end{aligned}$$

#### Correction.

1. On a :

$$|u_n| \leq \frac{1}{n^2},$$

et la série converge absolument.

2. La série est alternée, et le module du terme général décroît vers 0 à partir d'un certain rang : la série converge par application du critère des séries alternées.
3. Il s'agit d'une série alternée bien cachée. En effet,  $n^2$  a la parité de  $n$ , et  $\cos(k\pi) = (-1)^k$ . Le terme général vaut donc  $u_n = \frac{(-1)^n}{n \ln n}$ . La série converge par application immédiate du critère spécial des séries alternées.

### Exercice 14.

1. Démontrer que la série  $\sum_n \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$  converge.
2. Démontrer que  $\frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n} = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \frac{1}{n} + \frac{(-1)^n}{n\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{n\sqrt{n}}\right)$ .
3. Étudier la convergence de la série  $\sum_n \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}$ .
4. Qu'a-t-on voulu mettre en évidence dans cet exercice ?

#### Correction.

1. Ceci est une conséquence directe du critère des séries alternées. La série est alternée, et la valeur absolue du terme général décroît vers zéro.
2. On écrit que

$$\begin{aligned} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n} &= \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \times \frac{1}{1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}} \\ &= \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) \\ &= \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \frac{1}{n} + \frac{(-1)^n}{n\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{n\sqrt{n}}\right). \end{aligned}$$

3. Notons  $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}$ ,  $v_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ ,  $w_n = -\frac{1}{n}$  et  $t_n = \frac{(-1)^n}{n\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{n\sqrt{n}}\right)$ . Notons  $U_n$ ,  $V_n$ ,  $W_n$  et  $T_n$  leurs sommes partielles respectives. Alors  $(V_n)$  est convergente,  $(W_n)$  est divergente, et

$(T_n)$  est convergente. En effet,  $|t_n| \sim_{+\infty} \frac{1}{n\sqrt{n}}$  et la série  $\sum_n t_n$  est absolument convergente. Donc  $(U_n)$  est somme de deux suites convergentes et d'une suite divergente. Elle est donc divergente. Autrement dit, la série de terme général  $u_n$  est divergente.

4. Bien que  $\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n} \sim_{+\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ , l'une des deux séries converge et l'autre diverge. Dans le théorème de comparaison de deux séries, on ne peut donc pas se passer de l'hypothèse que les termes généraux gardent le même signe. Une autre conclusion est que  $u_n = (-1)^n a_n$ , avec  $a_n \geq 0$ ,  $(a_n)$  tend vers 0, et pourtant  $\sum_n u_n$  diverge. Dans le critère des séries alternées, on ne peut donc pas se passer de l'hypothèse  $(a_n)$  décroît.

### Exercice 15.

Suivant la valeur de  $\alpha \in \mathbb{R}$ , déterminer la nature de la série  $\sum_n u_n$ , où

$$u_n = \frac{\sqrt{1} + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n}}{n^\alpha}.$$

#### Correction.

On va d'abord déterminer un équivalent du numérateur par encadrement à une intégrale. En effet, la fonction  $x \mapsto \sqrt{x}$  est croissante sur  $[0, +\infty[$ , donc pour tout  $k \in \mathbb{R}$ , on a

$$\int_{k-1}^k \sqrt{x} dx \leq \sqrt{k} \leq \int_k^{k+1} \sqrt{x} dx.$$

On somme ces inégalités pour  $k$  allant de 1 à  $n$  pour trouver

$$\int_0^n \sqrt{x} dx \leq v_n \leq \int_1^{n+1} \sqrt{x} dx$$

où on a posé

$$v_n = \sqrt{1} + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n}.$$

On calcule les intégrales, et on en déduit que

$$v_n \sim_{+\infty} \frac{2}{3} n^{3/2}.$$

Il vient

$$u_n \sim_{+\infty} \frac{2}{3} n^{\frac{3}{2}-\alpha}.$$

La série  $\sum_n u_n$  converge donc si et seulement si  $\alpha > \frac{5}{2}$ . On peut aussi démontrer ceci par des majorations et des minorations un peu plus simple. D'abord, il est clair que

$$0 \leq u_n \leq \frac{n\sqrt{n}}{n^\alpha} = \frac{1}{n^{\alpha-\frac{3}{2}}},$$

ce qui démontre la convergence si  $\alpha > 5/2$ . D'autre part, si  $k$  est compris entre  $n/2$  et  $n$ , alors  $\sqrt{k} \geq \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{2}}$  et donc

$$u_n \geq \frac{(n - \lfloor \frac{n}{2} \rfloor) \sqrt{n}}{\sqrt{2} n^\alpha} \geq \frac{n\sqrt{n}}{2\sqrt{2} n^\alpha}.$$

Notons  $v_n$  le membre de droite de cette inégalité. Il est équivalent à  $\frac{C}{n^{\alpha-\frac{3}{2}}}$ . Si  $\alpha \leq 5/2$ , la série  $\sum_n v_n$  diverge et il en est de même de  $\sum_n u_n$  puisque  $0 \leq v_n \leq u_n$ .

### Exercice 16.

On souhaite étudier, suivant la valeur de  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ , la convergence de la série de terme général

$$u_n = \frac{1}{n^\alpha (\ln n)^\beta}.$$

1. Démontrer que la série converge si  $\alpha > 1$ .
2. Traiter le cas  $\alpha < 1$ .
3. On suppose que  $\alpha = 1$ . On pose  $T_n = \int_2^n \frac{dx}{x(\ln x)^\beta}$ .
  - (a) Montrer si  $\beta \leq 0$ , alors la série de terme général  $u_n$  est divergente.
  - (b) Montrer que si  $\beta > 1$ , alors la suite  $(T_n)$  est bornée, alors que si  $\beta \leq 1$ , la suite  $(T_n)$  tend vers  $+\infty$ .
  - (c) Conclure pour la série de terme général  $u_n$ , lorsque  $\alpha = 1$ .

#### Correction.

1. On fixe  $\gamma$  un réel tel que  $1 < \gamma < \alpha$ . La comparaison du comportement du logarithme et des polynômes en  $+\infty$  montre que :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^\gamma \frac{1}{n^\alpha (\ln n)^\beta} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(\ln n)^{-\beta}}{n^{\alpha-\gamma}} = 0$$

et ceci quelque soit la valeur de  $\beta$ . Autrement dit,  $u_n = o\left(\frac{1}{n^\gamma}\right)$ . Par comparaison à une série de Riemann, la série est convergente.

2. On va comparer cette fois à la série de terme général  $\frac{1}{n}$ . On a en effet

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \frac{1}{n^\alpha (\ln n)^\beta} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^{1-\alpha}}{(\ln n)^\beta} = +\infty.$$

Ainsi, pour  $n$  assez grand, on a

$$\frac{1}{n} \leq u_n.$$

Par comparaison à une série de Riemann divergente, la série de terme général  $u_n$  diverge.

3. (a) Si  $\beta \leq 0$ , alors on a

$$\frac{1}{n} \leq u_n$$

et on conclut comme précédemment que la série est divergente.

- (b) Si  $\beta \neq 1$ , on a

$$\int_2^n \frac{dx}{x(\ln x)^\beta} = \frac{1}{1-\beta} \left( \frac{1}{\ln^{\beta-1}(n)} - \frac{1}{\ln^{\beta-1} 2} \right).$$

Si  $\beta > 1$ , ceci tend vers  $\frac{1}{\beta-1} \frac{1}{\ln^{\beta-1} 2}$  et on a même que pour tout entier  $n \geq 2$

$$T_n \leq \frac{1}{\beta-1} \frac{1}{\ln^{\beta-1} 2}.$$

Si  $\beta < 1$ , on remarque immédiatement que  $(T_n)$  tend vers  $+\infty$ . Enfin, si  $\beta = 1$ , on sait que

$$\int_2^n \frac{dx}{x(\ln x)^\beta} = \ln(\ln n) - \ln(\ln 2)$$

et ceci tend aussi vers  $+\infty$ .

- (c) Il reste à traiter le cas  $\beta > 0$ . La fonction  $x \mapsto \frac{1}{x(\ln x)^\beta}$  est décroissante sur  $[2, +\infty[$ . On a alors pour  $k \geq 3$  :

$$\int_k^{k+1} \frac{dx}{x(\ln x)^\beta} \leq \frac{1}{k(\ln k)^\beta} \leq \int_{k-1}^k \frac{dx}{x(\ln x)^\beta}.$$

On somme ces inégalités pour  $k$  allant de 3 à  $n$  :

$$\int_3^{n+1} \frac{dx}{x(\ln x)^\beta} \leq \sum_{k=3}^n \frac{1}{k(\ln k)^\beta} \leq \int_2^n \frac{dx}{x(\ln x)^\beta}.$$

On en conclut que, si  $\beta > 1$ , la suite des sommes partielles de la série est majorée (par  $\frac{1}{\beta-1} \frac{1}{\ln^{\beta-1} 2}$ ) et donc comme on a une série à termes positifs, la série est convergente. Si  $\beta \leq 1$ , en reprenant le même raisonnement qu'à la question précédente, on trouve que la suite des sommes partielles est minorée par une suite tendant vers  $+\infty$ . Elle tend donc elle-même vers  $+\infty$ . La série est divergente.

### Exercice 17.

1. En remarquant que  $\frac{1}{n} \sim_{+\infty} \ln(n+1) - \ln(n)$ , donner un équivalent de la somme  $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ .
2. En remarquant que  $\frac{1}{n^2} \sim_{+\infty} \frac{1}{n(n-1)}$ , donner un équivalent du reste  $\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^2}$ .

#### Correction.

1. La série de terme général  $\frac{1}{n}$  est divergente (et son terme général est positif). On sait donc, par le théorème de sommation des relations de comparaison, que

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \sim_{+\infty} \sum_{k=1}^n (\ln(k+1) - \ln(k)) = \ln(n+1)$$

car la somme apparaissant à droite est télescopique. Puisque de plus  $\ln(n+1) \sim_{+\infty} \ln n$ , on obtient finalement  $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \sim_{+\infty} \ln(n)$ .

2. Cette fois, la série de terme général  $\frac{1}{n^2}$  est convergente (et son terme général est positif). On sait donc, par le théorème de sommation des relations de comparaison, que

$$\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} \sim_{+\infty} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k(k-1)}.$$

Or,

$$\frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$$

et la dernière somme est une somme télescopique. On trouve donc

$$\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} \sim_{+\infty} \frac{1}{n}.$$

### Exercice 18.

Soit pour  $n \geq 1$ ,  $u_n = \frac{1}{(2n-1)5^{2n-1}}$ .

1. Montrer que la série de terme général  $u_n$  converge.
2. On note  $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k$ . Montrer que  $R_n \leq \frac{25}{24}u_{n+1}$ .
3. En déduire la valeur de  $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$  à 0,001 près.

#### Correction.

1. Il suffit de remarquer que pour tout  $n \geq 1$ , on a

$$0 \leq u_n \leq \frac{1}{5^n}$$

et que le membre à droite de cette inégalité est le terme général d'une série convergente. On peut aussi appliquer la règle de d'Alembert (ce qui est légitime puisqu'on a affaire à une série à termes positifs). Observant que

$$\frac{u_{k+1}}{u_k} = \frac{1}{25} \times \frac{2k-1}{2k+1} \rightarrow \frac{1}{25}$$

on en déduit que la série de terme général  $u_n$  est convergente.

2. L'équation précédente montre qu'en réalité

$$\frac{u_{k+1}}{u_k} \leq \frac{1}{25}.$$

Par récurrence, on obtient que

$$u_{n+k+1} \leq 25^{-k}u_{n+1}.$$

Ainsi,

$$R_n \leq u_{n+1} \times \sum_{k=0}^{+\infty} 25^{-k} = \frac{25}{24}u_{n+1}.$$

3. Dès  $n = 2$ , on a  $R_n < 0,001$ . Une valeur approchée à  $10^{-3}$  près est donc donnée par  $u_1 + u_2 \simeq 0,202$ .

### Exercice 19.

Écrire un algorithme sous Python donnant un encadrement à  $10^{-5}$  près de  $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n \ln(n+1)}$ .

#### Correction.

On remarque d'abord que la série est convergente. Il s'agit d'une série alternée  $\sum_{n \geq 1} (-1)^n a_n$  où  $a_n = \frac{1}{n \ln(n+1)}$  est une suite décroissante vers 0. Notons  $S_n$  la somme partielle d'ordre  $n$  de cette série et  $S$  cette somme. Alors on peut appliquer le critère des séries alternées, et on sait que  $S$  est encadré par deux sommes partielles consécutives. Plus précisément ici, en tenant compte du

fait que  $S_{2n-1} \leq S_{2n}$ , on a  $S_{2n-1} \leq S \leq S_{2n}$ . Il suffit donc de calculer  $S_{2n-1}$  et  $S_{2n}$  jusqu'à ce que  $S_{2n} - S_{2n-1} = \frac{1}{2n \ln(2n+1)} \leq 10^{-5}$ .

### Exercice 20.

Soient  $(a, b) \in \mathbb{C}^2$  tels que  $|a| < 1$  et  $|b| < 1$ . Prouver que

$$\begin{cases} \frac{1}{(1-a)(1-b)} &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a^{n+1} - b^{n+1}}{a-b} & \text{si } a \neq b, \\ \frac{1}{(1-a)^2} &= \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1)a^n & \text{si } a = b. \end{cases}$$

#### Correction.

D'après la formule classique pour les séries géométriques, on a

$$\frac{1}{1-a} = \sum_{n \geq 0} a^n \text{ et } \frac{1}{1-b} = \sum_{n \geq 0} b^n.$$

Ces deux séries sont absolument convergentes puisque  $|a| < 1$  et  $|b| < 1$ . On peut faire le produit de Cauchy et donc on obtient que

$$\frac{1}{1-a} \times \frac{1}{1-b} = \sum_{n \geq 0} w_n \text{ avec } w_n = \sum_{k=0}^n a^k b^{n-k}.$$

Si  $a = b$ , on trouve directement que  $w_n = \sum_{k=0}^n a^n = (n+1)a^n$ . Si  $a \neq b$ , alors il faut utiliser la factorisation

$$a^{n+1} - b^{n+1} = (a-b) \times \sum_{k=0}^n a^k b^{n-k}$$

qui donne le résultat. Dans le cas où  $a \neq b$ , on peut très facilement conclure sans utiliser le produit de Cauchy, en calculant séparément la somme de chaque série géométrique  $\sum_{n \geq 0} a^{n+1}$  et  $\sum_{n \geq 0} b^{n+1}$ .

### Exercice 21.

Pour  $n \geq 0$ , on pose  $w_n = 2^{-n} \sum_{k=0}^n \frac{4^k}{k!}$ .

1. Montrer que la série de terme général  $w_n$  converge.
2. Calculer sa somme en utilisant le produit d'une série géométrique par une autre série classique.

### Correction.

L'exercice repose sur la définition de l'exponentielle par une série : pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , on a

$$\exp(x) = \sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{n!}.$$

1. Pour chaque  $n \geq 0$ ,  $w_n$  est positif et satisfait

$$w_n \leq 2^{-n} \exp(4).$$

Puisque la série de terme général  $2^{-n} \exp(4)$  est convergente, il en est de même de la série de terme général  $w_n$ .

2. Écrivons le produit de Cauchy de  $\sum_{k \geq 0} \frac{b^k}{k!}$  par  $\sum_{k \geq 0} a^k$ , où  $a$  et  $b$  sont des réels avec  $|a| < 1$ . Ces deux séries sont absolument convergentes, et on a :

$$\exp(b) \times \frac{1}{1-a} = \left( \sum_{k \geq 0} \frac{b^k}{k!} \right) \times \left( \sum_{k \geq 0} a^k \right) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n$$

où  $u_n$  est défini par

$$u_n = \sum_{k=0}^n \frac{b^k}{k!} a^{n-k} = a^n \sum_{k=0}^n \frac{(b/a)^k}{k!}.$$

Pour  $a = 1/2$  et  $b = 2$ , on trouve  $w_n = u_n$ . Ainsi, on a

$$\sum_{n \geq 0} w_n = \exp(2) \times \frac{1}{1-1/2} = 2 \exp(2).$$

### Exercice 22.

Soit, pour  $n \geq 0$ ,  $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$ .

1. Vérifier que  $\sum_n u_n$  est semi-convergente.
2. Montrer que le produit de Cauchy de  $\sum u_n$  par  $\sum u_n$  ne converge pas.
3. Soit  $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  définie par  $\sigma(3p) = 2p$ ,  $\sigma(3p+1) = 4p+1$ ,  $\sigma(3p+2) = 4p+3$ . Vérifier que  $\sigma$  est une permutation de  $\mathbb{N}$ . Que peut-on dire de la série  $\sum_n u_{\sigma(n)}$  ?

### Correction.

1. La convergence de  $\sum u_n$  se démontre par une simple application du critère des séries alternées. La série ne converge pas absolument, par application du critère de Riemann.
2. Le terme général de la série produit de Cauchy est donné par :

$$v_n = \sum_{k=0}^n u_k u_{n-k} = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{\sqrt{k+1}} \frac{(-1)^{n-k}}{\sqrt{n-k+1}} = (-1)^n \sum_{k=0}^n \frac{1}{\sqrt{(k+1)(n+1-k)}}.$$

Soit  $f(x) = (x+1)(n+1-x)$ . Sa dérivée est  $f'(x) = n - 2x$ . Une étude rapide montre donc

que sur  $[0, n]$ ,  $f$  atteint son maximum en  $n/2$  et donc que, pour tout  $k \in \{0, \dots, n\}$ , on a

$$\frac{1}{\sqrt{(k+1)(n+1-k)}} \geq \frac{1}{\sqrt{(n/2+1)(n/2+1)}}.$$

On obtient alors

$$|v_n| \geq n \times \frac{1}{\sqrt{(n/2+1)(n/2+1)}} \geq C > 0.$$

Ainsi,  $v_n$  ne tend pas vers 0 et le produit de Cauchy de ces deux séries ne converge pas.

3. Il est d'abord clair que  $\sigma$  est une bijection de  $\mathbb{N}$ . En effet, tout nombre est ou bien pair, et donc de la forme  $2p$ , ou bien impair, et ce sous cas se divise en congru à 1 modulo 4 ou congru à 3 modulo 4. Posons

$$w_n = u_{\sigma(3n)} + u_{\sigma(3n+1)} + u_{\sigma(3n+2)} = \frac{1}{\sqrt{2n+1}} - \frac{1}{\sqrt{4n+2}} - \frac{1}{\sqrt{4n+4}},$$

de sorte que

$$w_n \sim \frac{C}{\sqrt{n}}$$

avec  $C < 0$ . Ainsi, la série de terme général  $w_n$  diverge. Or,

$$\sum_{n=1}^N w_n = \sum_{n=3}^{3N+2} u_{\sigma(n)}.$$

La série de terme général  $u_{\sigma(n)}$  est donc aussi divergente.

## b. Exercices d'entraînement

### Exercice 23.

- Soit  $(a_n)$  et  $(b_n)$  deux suites de réels strictement positifs. On suppose qu'il existe  $N \in \mathbb{N}$  tel que, pour tout  $n \geq N$ ,  $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n}$ .
  - Démontrer que pour tout  $n \geq N$ ,  $b_N a_n \leq a_N b_n$ .
  - En déduire que
    - Si  $\sum b_n$  converge, alors  $\sum a_n$  converge.
    - Si  $\sum a_n$  diverge, alors  $\sum b_n$  diverge.
- Soit  $\alpha > 0$  et  $b_n = \frac{1}{n^\alpha}$ . Justifier que

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = 1 - \frac{\alpha}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

- Soit  $(a_n)$  une suite de réels positifs telle qu'il existe  $\beta \in \mathbb{R}$  avec

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = 1 - \frac{\beta}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

- On suppose  $\beta > 1$ . Démontrer qu'il existe  $\alpha > 1$  et  $N \in \mathbb{N}$  tel que, pour tout  $n \geq N$ ,

on ait, en gardant les mêmes notations pour  $(b_n)$ ,

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n}.$$

En déduire que  $\sum_n a_n$  converge.

- (b) Démontrer que si  $\beta < 1$ , alors  $\sum_n a_n$  diverge.
- (c) Application : Soit  $a_n = \frac{(2n)!}{(n!)^2} \left(\frac{1}{4}\right)^n$ . Démontrer que  $\sum_n a_n$  diverge.

#### Correction.

1. (a) On procède par récurrence sur  $n$ . Pour  $n \geq N$ , posons  $P_n$  : " $b_N a_n \leq a_N b_n$ ". Initialisation : on a  $b_N a_N = a_N b_N$  donc  $P_n$  est vraie. Hérédité : Soit  $n \geq N$  telle que  $P_n$  est vraie. Alors on a

$$\begin{aligned} b_N a_{n+1} &\leq b_N a_n \frac{b_{n+1}}{b_n} \\ &\leq a_N b_n \frac{b_{n+1}}{b_n} \text{ par hypothèse de récurrence} \\ &\leq a_N b_{n+1}. \end{aligned}$$

Donc  $P_{n+1}$  est vraie. Conclusion : Par le principe de récurrence,  $P_n$  est vraie pour tout entier  $n \geq N$ .

- (b) i. On a  $0 \leq a_n \leq \frac{a_N}{b_N} b_n$  et la série  $\sum_n b_n$  converge. Par majoration de séries positives, la série  $\sum_n a_n$  converge.  
ii. On a  $0 \leq \frac{b_N}{a_N} a_n \leq b_n$  et la série  $\sum_n a_n$  diverge. Par minoration de séries positives, la série  $\sum_n b_n$  diverge.

2. C'est un simple développement limité. En effet, on a

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-\alpha} = 1 - \frac{\alpha}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

3. (a) Soit  $\alpha \in ]1; \beta[$ . Alors on a

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} - \frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{\alpha - \beta}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

Or,  $\alpha - \beta < 0$ . Donc, pour  $n$  assez grand,  $\frac{a_{n+1}}{a_n} - \frac{b_{n+1}}{b_n}$  est du signe de  $\frac{\alpha - \beta}{n}$ , c'est-à-dire est négatif. On a donc l'existence de  $N \geq 1$  tel que, pour tout  $n \geq N$ ,

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n}.$$

Puisque  $\sum_n b_n$  converge (puisque  $\alpha > 1$ ), on conclut en utilisant le résultat de la question 1.

- (b) On fait un raisonnement similaire, mais en choisissant cette fois  $\alpha \in ]\beta; 1[$ . De la même façon, on démontre l'existence de  $N \geq 1$  tel que, pour tout  $n \geq N$ ,

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} \leq \frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

Puisque  $\sum_n b_n$  diverge, on déduit de la question 1 la divergence de  $\sum_n a_n$  (on échange bien sûr le rôle joué par  $(a_n)$  et  $(b_n)$ ).

(c) On a

$$\begin{aligned}\frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{(2n+2)!}{(2n)!} \times \frac{(n!)^2}{((n+1)!)^2} \times \frac{4^n}{4^{n+1}} \\ &= \frac{(2n+2)(2n+1)}{4(n+1)^2} \\ &= \frac{2n+1}{2n+2} \\ &= 1 - \frac{1}{2n+2} \\ &= 1 - \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right).\end{aligned}$$

Appliquons le résultat précédent avec  $\beta = 1/2$ , on trouve que la série  $\sum_n a_n$  est divergente.

#### Exercice 24.

Soit  $(u_n)$  une suite à termes positifs telle qu'il existe  $a \in \mathbb{R}$  vérifiant

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{a}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

1. On suppose  $a > 1$ . Soit  $b \in ]1, a[$  et posons  $v_n = \frac{1}{n^b}$ . Comparer  $u_n$  et  $v_n$ . En déduire que  $\sum_n u_n$  converge si  $a > 1$ .
2. Démontrer que  $\sum_n u_n$  diverge si  $a < 1$ .
3. En utilisant les séries de Bertrand, montrer que le cas  $a = 1$  est douteux.
4. On suppose que  $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{1}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$ . On pose  $v_n = \ln(nu_n)$  et  $w_n = v_{n+1} - v_n$ .
  - (a) Montrer que  $w_n = O\left(\frac{1}{n^2}\right)$ .
  - (b) En déduire que  $u_n \sim \frac{\lambda}{n}$  avec  $\lambda > 0$  et que  $\sum u_n$  est divergente.

#### Correction.

1. Supposons d'abord  $a > 1$ , et prenons  $b \in ]1, a[$ . Posons aussi  $v_n = \frac{1}{n^b}$ . Alors on a

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{n^b}{(n+1)^b} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-b} = 1 - \frac{b}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

Ainsi, il existe un entier  $n_0$  tel que, pour  $n \geq n_0$ , on a

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{v_{n+1}}{v_n}.$$

Par récurrence, on montre aisément par récurrence sur  $n$  que, pour  $n \geq n_0$ ,

$$u_n \leq Cv_n$$

avec  $C = \frac{u_{n_0}}{v_{n_0}}$ . Par comparaison (les séries sont à terme positif), la série de terme général  $u_n$  converge puisque la série de terme général  $v_n$  converge.

2. Dans le cas où  $a < 1$ , on procède de même en choisissant cette fois  $b \in ]a, 1[$ . On trouve alors que, pour  $n$  assez grand,

$$u_n \geq Cv_n.$$

Puisque la série de terme général  $v_n$  diverge (cette fois,  $b < 1$ ), la série de terme général  $u_n$  diverge.

3. Posons  $u_n = \frac{1}{n(\ln n)^b}$  dont on rappelle qu'elle converge si et seulement si  $b > 1$ . Alors,

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \left( \frac{n}{n+1} \right) \left( \frac{\ln(n)}{\ln(n+1)} \right)^b = \left( 1 - \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) \left( \frac{\ln(n)}{\ln(n) + \ln(1+1/n)} \right)^b.$$

Or,

$$\frac{\ln n}{\ln n + \ln(1+1/n)} = \frac{\ln n}{\ln n + O(1/n)} = \frac{1}{1 + O(1/n \ln n)} = 1 + O\left(\frac{1}{n \ln n}\right).$$

Mettant à la puissance  $b$ , on a

$$\left( \frac{\ln n}{\ln n + \ln(1+1/n)} \right)^b = 1 + O\left(\frac{1}{n \ln n}\right).$$

Effectuant le produit des deux développements limités, on trouve qu'au premier ordre,

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

Ainsi, on trouve le même résultat, alors que la série de terme général  $u_n$  est parfois convergente, parfois divergente. Le cas  $a = 1$  est bien un cas limite.

4. (a) On a

$$\begin{aligned} w_n &= \ln \left( \frac{(n+1)u_{n+1}}{nu_n} \right) = \ln \left( \left( 1 + \frac{1}{n} \right) \left( 1 - \frac{1}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) \right) \\ &= \ln \left( 1 + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) \\ &= O\left(\frac{1}{n^2}\right). \end{aligned}$$

- (b) La question précédente prouve que la série de terme général  $w_n$  converge. Ainsi, il existe  $C \in \mathbb{R}$  tel que  $\sum_{k=1}^n w_k \rightarrow C$ . Mais  $\sum_{k=1}^{n-1} w_k = \ln(nu_n) - \ln(u_1)$ . On en déduit que la suite  $(\ln(nu_n))$  converge vers un réel. Passant à l'exponentielle, on en déduit qu'il existe  $\lambda > 0$  tel que  $nu_n \rightarrow \lambda$  c'est-à-dire  $u_n \sim \frac{\lambda}{n}$ . Ainsi, par comparaison, la série de terme général  $u_n$  diverge.

### Exercice 25.

Déterminer  $\lim_{a \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a}{n^2 + a^2}$ .

**Correction.**

Posons, pour  $a > 0$ ,  $S(a) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a}{n^2 + a^2}$ . Cette quantité est bien définie car on a affaire à une série à terme positif dont le terme général est équivalent à  $\frac{a}{n^2}$ . La fonction  $x \mapsto \frac{a}{x^2 + a^2}$  est décroissante sur  $[0, +\infty[$ . On en déduit, par comparaison à une intégrale, que

$$\int_1^{N+1} \frac{a}{a^2 + x^2} dx \leq \sum_{n=1}^N \frac{a}{n^2 + a^2} \leq \int_0^N \frac{a}{a^2 + x^2} dx.$$

On calcule ces intégrales et on trouve

$$\arctan\left(\frac{N+1}{a}\right) - \arctan\left(\frac{1}{a}\right) \leq \sum_{n=1}^N \frac{a}{n^2 + a^2} \leq \arctan\left(\frac{N}{a}\right).$$

On fait tendre  $N$  vers  $+\infty$  et on trouve

$$\frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{1}{a}\right) \leq S(a) \leq \frac{\pi}{2}.$$

Par le théorème des gendarmes, on en déduit que

$$\lim_{a \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a}{n^2 + a^2} = \frac{\pi}{2}.$$

**Exercice 26.**

Le but de l'exercice est de calculer  $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$  et de donner un développement asymptotique de la somme partielle  $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$ .

1. (a) Soit  $\alpha > 1$  et  $k \geq 2$ . Démontrer que

$$\int_k^{k+1} \frac{dt}{t^\alpha} \leq \frac{1}{k^\alpha} \leq \int_{k-1}^k \frac{dt}{t^\alpha}.$$

- (b) En déduire que

$$\sum_{k \geq n} \frac{1}{k^\alpha} \sim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{(\alpha - 1)n^{\alpha-1}}.$$

2. Soit  $f$  une fonction de classe  $C^1$  sur  $[0, \pi]$ . Démontrer que

$$\int_0^\pi f(t) \sin\left(\frac{(2n+1)t}{2}\right) dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

3. On pose  $A_n(t) = \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos(kt)$ . Vérifier que, pour  $t \in ]0, \pi]$ , on a

$$A_n(t) = \frac{\sin((2n+1)t/2)}{2 \sin(t/2)}.$$

4. Déterminer deux réels  $a$  et  $b$  tels que, pour tout  $n \geq 1$ ,

$$\int_0^\pi (at^2 + bt) \cos(nt) dt = \frac{1}{n^2}.$$

Vérifier alors que

$$\int_0^\pi (at^2 + bt) A_n(t) dt = S_n - \frac{\pi^2}{6}.$$

5. Déduire des questions précédentes que  $S_n \rightarrow \frac{\pi^2}{6}$ .  
 6. Déduire des questions précédentes que

$$S_n = \frac{\pi^2}{6} - \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

**Correction.**

1. (a) On sait que  $\frac{1}{t^\alpha} \leq \frac{1}{k^\alpha}$  pour  $t \in [k, k+1]$ . On intègre cette inégalité entre  $k$  et  $k+1$  et on trouve la partie gauche de l'inégalité demandée. De même, on sait que  $\frac{1}{t^\alpha} \geq \frac{1}{k^\alpha}$  pour  $t \in [k-1, k]$ , et on intègre cette inégalité entre  $k-1$  et  $k$ .  
 (b) On somme ces inégalités pour  $k$  allant de  $n$  à  $+\infty$ , et on trouve :

$$\int_n^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha} \leq \sum_{k \geq n} \frac{1}{k^\alpha} \leq \int_{n-1}^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha},$$

soit encore

$$\frac{1}{(\alpha-1)n^{\alpha-1}} \leq \sum_{k \geq n} \frac{1}{k^\alpha} \leq \frac{1}{(\alpha-1)(n-1)^{\alpha-1}}.$$

Puisque

$$\frac{(n-1)^{\alpha-1}}{n^{\alpha-1}} \rightarrow 1,$$

on en déduit le résultat demandé.

2. Une intégration par parties donne

$$\begin{aligned} \int_0^\pi f(t) \sin((2n+1)t/2) dt &= \frac{2}{2n+1} f(0) - \frac{2}{2n+1} \cos\left(\frac{(2n+1)\pi}{2}\right) f(\pi) \\ &\quad + \frac{2}{2n+1} \int_0^\pi f'(t) \cos((2n+1)t/2) dt. \end{aligned}$$

D'une part, on a

$$\frac{2}{2n+1} f(0) - \frac{2}{2n+1} \cos\left(\frac{(2n+1)\pi}{2}\right) f(\pi) \rightarrow 0$$

(produit d'une suite bornée par une suite qui tend vers 0). De plus, on a aussi

$$\left| \int_0^\pi f'(t) \cos((2n+1)t/2) dt \right| \leq \int_0^\pi |f'(t)| dt,$$

et donc on a

$$\int_0^\pi f(t) \sin((2n+1)t/2) dt \rightarrow 0.$$

3. C'est un calcul classique. On écrit  $\cos(kt) = \Re e(e^{ikt})$  et on utilise la somme d'une série géométrique de raison différente de 1 (puisque  $t \in ]0, \pi]$ ). On obtient

$$\begin{aligned} A_n(t) &= \frac{1}{2} + \Re e \left( \frac{e^{it} - e^{i(n+1)t}}{1 - e^{it}} \right) = \frac{1}{2} + \Re e \left( e^{i(n+1)t/2} \frac{\sin(nt/2)}{\sin(t/2)} \right) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{\sin(nt/2) \cos((n+1)t/2)}{\sin(t/2)}. \end{aligned}$$

Une petite formule de trigo donne

$$A_n(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2 \sin(t/2)} \times (\sin((2n+1)t/2) + \sin(-t/2))$$

ce qui finalement donne le résultat.

4. On calcule l'intégrale en faisant deux intégrations par parties :

$$\begin{aligned} \int_0^\pi (at^2 + bt) \cos(nt) dt &= \left[ (at^2 + bt) \frac{\sin(nt)}{n} \right]_0^\pi - \int_0^\pi (2at + b) \frac{\sin(nt)}{n} dt \\ &= 0 - \left[ (2at + b) \frac{-\cos(nt)}{n^2} \right]_0^\pi - \int_0^\pi 2a \frac{\cos(nt)}{n^2} dt \\ &= \frac{(2a\pi + b)(-1)^n - b}{n^2}. \end{aligned}$$

Ceci vaudra  $1/n^2$  pour  $b = -1$  et  $a = 1/2\pi$ . On déduit alors

$$\int_0^\pi (at^2 + bt) A_n(t) dt = \frac{1}{2} \int_0^\pi \left( \frac{t^2}{2\pi} - t \right) dt + S_n = S_n - \frac{\pi^2}{6}.$$

5. On a donc prouvé que

$$S_n - \frac{\pi^2}{6} = \int_0^\pi f(t) A_n(t) dt,$$

avec  $f(t) = \frac{at^2 + bt}{2 \sin(t/2)}$ . Pour conclure, il s'agit de prouver que  $f$  est de classe  $C^1$  en 0. Clairement,  $f$  est de classe  $C^1$  sur  $]0, \pi]$ . Pour prouver que  $f$  est dérivable en 0 et que sa dérivée y est continue, on peut appliquer le théorème de prolongement d'une dérivée. On remarque ainsi que, pour  $t \in ]0, \pi]$ ,

$$\begin{aligned} f'(t) &= \frac{2(2at + b) \sin(t/2) - (at^2 + bt) \cos(t/2)}{4 \sin^2(t/2)} \\ &= \frac{2(2at + b)(t/2 + o(t^2)) - (at^2 + bt)(1 - t^2/2 + o(t^2))}{t^2 + o(t^2)} \\ &= \frac{at^2 + o(t^2)}{t^2 + o(t^2)} \rightarrow a. \end{aligned}$$

Par le théorème de prolongement d'une dérivée,  $f$  est de classe  $C^1$  en 0. On peut alors appliquer le résultat des questions précédentes.

6. On a

$$S_n - \frac{\pi^2}{6} = - \sum_{k \geq n+1} \frac{1}{n^2} \sim_{+\infty} -\frac{1}{n}$$

d'après la première question.

### Exercice 27.

Le but de l'exercice est de déterminer un équivalent du reste de certaines séries alternées. On considère  $(u_n)_{n \geq 0}$  une suite de réels positifs décroissant vers 0, et on considère la série  $\sum_{n \geq 0} (-1)^n u_n$  dont on rappelle qu'elle est convergente. On note  $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} (-1)^k u_k$  son reste. On suppose de plus que la suite  $(u_n)$  vérifie les deux conditions suivantes :

$$\forall n \geq 0, \quad u_{n+2} - 2u_{n+1} + u_n \geq 0 \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = 1.$$

1. Démontrer que pour tout  $n \geq 0$ ,  $|R_n| + |R_{n+1}| = u_{n+1}$ .
2. Démontrer que la suite  $(|R_n|)$  est décroissante.
3. En déduire que  $R_n \sim_{+\infty} \frac{(-1)^{n+1} u_n}{2}$ .

#### Correction.

1. D'après le critère des séries alternées,  $R_n$  est du signe de son premier terme,  $(-1)^{n+1} u_{n+1}$ , ou encore de  $(-1)^{n+1}$  puisque  $u_{n+1}$  est positif. On a donc  $|R_n| = (-1)^{n+1} R_n$  et  $|R_{n+1}| = (-1)^{n+2} R_{n+1}$ . On en déduit que

$$|R_n| + |R_{n+1}| = (-1)^{n+1} (R_n - R_{n+1}) = u_{n+1}.$$

2. En reprenant le même raisonnement, on a

$$\begin{aligned} |R_n| - |R_{n+1}| &= (-1)^{n+1} (R_n + R_{n+1}) \\ &= (-1)^{n+1} \sum_{k=n+1}^{+\infty} (-1)^k (u_k - u_{k+1}) \\ &= (-1)^{n+1} \sum_{k=n+1}^{+\infty} (-1)^k v_k \end{aligned}$$

où on a posé  $v_k = u_k - u_{k+1}$ . On note que  $v_k$  est positif puisque la suite  $(u_n)$  est décroissante et que  $(v_k)$  tend vers 0. De plus, pour tout  $k \in \mathbb{N}$ , on a

$$v_k - v_{k+1} = u_k - 2u_{k+1} + u_{k+2} \geq 0.$$

La série  $\sum_{k=n+1}^{+\infty} (-1)^k v_k$  vérifie donc le critère des séries alternées et est du signe de  $(-1)^{n+1}$ . On obtient bien que  $|R_n| - |R_{n+1}|$  est positif.

3. D'après les deux questions précédentes, on a

$$u_{n+1} \leq 2|R_n| \text{ et } 2|R_{n+1}| \leq u_{n+1}$$

ce qui peut se réécrire en

$$\frac{u_{n+1}}{2} \leq |R_n| \leq \frac{u_n}{2}.$$

Sachant que  $u_{n+1}/u_n$  tend vers 1, on en déduit que  $|R_n| \sim_{+\infty} \frac{u_n}{2}$ . Maintenant, on sait aussi que  $R_n = (-1)^{n+1} |R_n|$ . On en déduit le résultat demandé.

### c. Exercices d'approfondissement

### Exercice 28.

Soient  $(u_n)$  et  $(a_n)$  deux suites de réels strictement positifs.

- On suppose qu'il existe  $p \in \mathbb{N}$  et  $A > 0$  tels que, pour tout  $n \geq p$ , on a

$$a_n \frac{u_n}{u_{n+1}} - a_{n+1} \geq A.$$

Démontrer que la série  $\sum_n u_n$  converge.

- On suppose qu'il existe un entier  $p \in \mathbb{N}$  tel que, pour tout  $n \geq p$ , on a

$$a_n \frac{u_n}{u_{n+1}} - a_{n+1} \leq 0.$$

On suppose en outre que  $\sum_n \frac{1}{a_n}$  diverge. Prouver que  $\sum_n u_n$  diverge.

- Application 1 : retrouver la règle de d'Alembert.
- Application 2 : étudier la convergence de  $\sum_n u_n$  pour

$$u_n = \frac{1 \times 3 \times 5 \times \cdots \times (2n-1)}{2 \times 4 \times \cdots \times 2n} \text{ et } u_n = \frac{1}{n} \times \frac{1 \times 3 \times 5 \times \cdots \times (2n-1)}{2 \times 4 \times \cdots \times 2n}.$$

#### Correction.

- L'idée est de se ramener à une somme télescopique. En effet, on a, pour tout  $n \geq p$ ,

$$Au_{n+1} \leq a_n u_n - a_{n+1} u_{n+1}.$$

Soit  $N \geq p$ , on somme les inégalités précédentes pour  $n$  allant de  $p$  à  $N-1$ . On obtient

$$A \sum_{n=p}^{N-1} u_{n+1} \leq a_p u_p - a_N u_N \leq a_p u_p.$$

Notant  $S_N = \sum_{n=1}^N u_n$  la somme partielle de la série, on obtient

$$S_N \leq \frac{a_p u_p}{A} + S_p.$$

Autrement dit, la suite des sommes partielles  $(S_N)_N$  est majorée. Comme on a affaire à une série à termes positifs, ceci assure la convergence de la série.

- L'hypothèse s'écrit encore  $a_{n+1} u_{n+1} \geq a_n u_n$  pour tout  $n \geq p$ . On en déduit que  $a_n u_n \geq a_p u_p$ , et donc que

$$u_n \geq a_p u_p \times \frac{1}{a_n}.$$

Or la série  $\sum_n \frac{1}{a_n}$  est divergente et à termes positifs. On a donc par comparaison divergence de la série  $\sum_n u_n$ .

- Supposons que  $\frac{u_{n+1}}{u_n} \rightarrow l > 1$ . Posons  $a_n = 1$ . Alors  $\frac{u_n}{u_{n+1}} - 1 \rightarrow \frac{1}{l} - 1 < 0$ , et donc pour  $n$  assez grand, on a  $\frac{u_n}{u_{n+1}} - 1 \leq 0$ . Puisque la série  $\sum_n 1$  diverge, il en est de même de  $\sum_n u_n$ . Au contraire, supposons maintenant que  $l < 1$  et, dans un premier temps,  $l \neq 0$ . On prend la même suite  $(a_n)$ , et on observe que  $\frac{u_n}{u_{n+1}} - 1 \rightarrow \frac{1}{l} - 1 > 0$ , et donc pour  $n$  assez grand, on a

$$\frac{u_n}{u_{n+1}} - 1 \geq \frac{\frac{1}{l} - 1}{2} > 0.$$

Par le premier point,  $\sum_n u_n$  converge. Finalement, si  $l = 0$ , alors  $u_n/u_{n+1}$  tends vers  $+\infty$  et donc, à partir d'un certain rang,

$$\frac{u_n}{u_{n+1}} - 1 \geq 1.$$

On conclut à nouveau à la convergence de  $\sum_n u_n$  à l'aide de la première question.

4. Pour les deux séries, la règle de d'Alembert ne permet pas de conclure car on est dans son cas litigieux où le quotient  $u_{n+1}/u_n$  tend vers 1. On va conclure par la règle de Kummer en utilisant à chaque fois  $a_n = n$ . Pour la première série, on a

$$a_n \frac{u_n}{u_{n+1}} - a_{n+1} = -\frac{n+1}{2n+1} \leq 0.$$

Puisque la série  $\sum_n \frac{1}{n}$  est divergente, il en est de même de  $\sum_n u_n$ . Pour la deuxième série, on a cette fois

$$a_n \frac{u_n}{u_{n+1}} - a_{n+1} = \frac{n+1}{2n+1} \geq \frac{1}{2} > 0.$$

Ainsi, par la règle de Kummer, la série est convergente.

### Exercice 29.

Soit  $(u_n)$  une suite de réels positifs telle que  $\sum_n u_n$  diverge. On note  $S_n = \sum_{k=1}^n u_k$ . A l'aide d'une comparaison à une intégrale, démontrer que pour tout  $\alpha > 1$ , la série  $\sum_n \frac{u_n}{S_n^\alpha}$  est convergente.

#### Correction.

On va comparer à une intégrale chaque terme  $\frac{u_n}{S_n^\alpha}$ . Ce ne semble pas si facile! Mais on peut remarquer que, pour  $n \geq 2$ ,

$$\frac{u_n}{S_n^\alpha} = \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n^\alpha} \leq \int_{S_{n-1}}^{S_n} \frac{dt}{t^\alpha}.$$

On en déduit, pour tout  $N \geq 2$ , que

$$\sum_{n=2}^N \frac{u_n}{S_n^\alpha} \leq \int_{S_1}^{S_N} \frac{dt}{t^\alpha} \leq \frac{1}{(\alpha-1)S_1^{\alpha-1}}.$$

La série est à termes positifs et ses sommes partielles sont majorées : elle est convergente.

### Exercice 30.

Soit  $f : [1, +\infty[ \rightarrow \mathbb{C}$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$  telle que  $f'$  est intégrable sur  $[1, +\infty[$ .

1. Pour  $n \in \mathbb{N}$ , on pose

$$u_n = \int_n^{n+1} f(t)dt - f(n).$$

Démontrer que  $\sum_n u_n$  est absolument convergente.

2. Démontrer que la série numérique  $\sum f(n)$  converge si et seulement si la suite  $(\int_1^n f(t)dt)$  converge.
3. Application : étudier la nature de  $\sum_n \frac{\sin(\sqrt{n})}{n}$ .

**Correction.**

1. On écrit que

$$u_n = \int_n^{n+1} (f(t) - f(n)) dt.$$

Il vient

$$|u_n| \leq \int_n^{n+1} |f(t) - f(n)| dt.$$

Or, pour tout  $t \in [n, n+1]$ , on a

$$f(t) - f(n) = \int_n^t f'(u) du$$

d'où il vient

$$|u_n| \leq \int_n^{n+1} \int_n^t |f'(u)| du dt \leq \int_n^{n+1} \int_n^{n+1} |f'(u)| du dt \leq \int_n^{n+1} |f'(u)| du.$$

Puisque  $f'$  est intégrable, on sait que la suite  $(\int_1^n |f'(t)| dt)$  converge, ou encore que la série  $\sum_n \int_n^{n+1} |f'(t)| dt$  converge. Par comparaison de séries à termes positifs, la série  $\sum_n |u_n|$  converge.

2. C'est presque immédiat. On écrit en effet

$$f(n) = \int_n^{n+1} f(t) dt - u_n.$$

Puisque la série  $\sum u_n$  converge, la convergence de  $\sum f(n)$  équivaut à la convergence de  $\sum_n \int_n^{n+1} f(t) dt$ , c'est-à-dire à la convergence de la suite  $(\int_1^n f(t) dt)$ .

3. Posons  $f(t) = \frac{\sin(\sqrt{t})}{t}$ . On va déjà prouver que l'on est dans les conditions d'application du résultat précédent. Pour cela, on remarque que

$$f'(t) = \frac{\frac{t}{2\sqrt{t}} \cos(\sqrt{t}) - \sin(\sqrt{t})}{t^2} =_{+\infty} O\left(\frac{1}{t^{3/2}}\right).$$

Ainsi,  $f'$  est bien intégrable sur  $[1, +\infty[$ . On prouve ensuite que la suite  $(\int_1^n f(t) dt)$  est convergente. C'est classique. Par le changement de variables  $u = \sqrt{t}$ , on a

$$\int_1^n \frac{\sin \sqrt{t}}{t} dt = 2 \int_1^{\sqrt{n}} \frac{\sin u}{u} du.$$

La convergence de cette dernière intégrale se démontre en effectuant une intégration par parties...